

«ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ОНКОЛОГОВ ПО ОПУХОЛЯМ ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ»

115478, Москва, Каширское шоссе, 23. ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Тел./факс +7 (499) 3249075, +7 926 3579087, +7 903 129 78 57

www.osors.com

На III Конференции ОСОРС выступил проф. Свен Беккер, посвятив свой доклад расширенным операциям при раке шейки матки эндоскопическим доступом. Мы попросили его ответить на несколько особо интересующих нас вопросов.



Интервью проф. Sven Becker (Director Frankfurt University Hospital, Dept. Gynecology and Obstetrics, Div. Gynecologic Oncology)

Г-н профессор! От имени российских онкогинекологов позвольте поблагодарить Вас за блестящую лекцию и задать с Вашего разрешения несколько вопросов. Где Вы повышали свою квалификацию?

— Я прошел обучение в резидентуре университета Johns Hopkins University с 1997 по 2001 г., а далее с 2001 по 2011 г. работал в клинике университета города Тюбингена (Tübingen University — Oncology, Laparoscopy, Breast Surgery Dept).

Как Вы считаете, возможен ли III тип операции при раке шейки матки лапароскопическим доступом?

— Да, вполне. Даже более того, лапароскопические операции имеют ряд преимуществ: уменьшаются кровопотеря и болезненные ощущения, сокращается период нахождения в клинике, значительно снижается частота послеоперационных осложнений и требуется меньше времени на восстановление работоспособности пациенток.

Как Вы считаете, какое количество лимфатических узлов должно быть удалено при местнораспространенном раке шейки матки?

— По нашим данным, удаление более 30 узлов повышает выживаемость больных на 35%.

Как Вы относитесь к новой парадигме участия маточной трубы в этиологии низкодифференцированного серозного рака яичников?

— Практически во всем мире это считается доказанным фактом, поэтому при неонкологических операциях в гинекологии производят тубэктомию, естественно, с индивидуальным подходом в каждом конкретном случае.

